

110 年度關懷員在職教育訓練考題 (前測)

單位 _____ 姓名 _____

選擇題 配分:每題 5 分、共 20 題

選擇題

- 【 A 】下列何者是多重抗藥性結核病的定義？
 - 罹患同時對 Isoniazid 及 Rifampin 抗藥性的結核菌
 - 罹患同時對 Isoniazid 及 Ethambutol 抗藥性的結核菌
 - 罹患同時對 Isoniazid 及 Pyrazinamide 抗藥性的結核菌
 - 罹患同時對 Rifampin, Ethambutol 及 Pyrazinamide 抗藥性的結核菌
- 【 B 】多重抗藥性結核病是第幾類的法定傳染病？
 - 第一類
 - 第二類
 - 第三類
 - 第四類
- 【 D 】下列何者並非目前要採行快速分子診斷是否為多重抗藥性結核的對象？
 - 治療失敗的病人
 - 治療後再復發的病人
 - 長期居住在越南工作的台灣民眾
 - 所有居住在基隆市的病人
- 【 A 】關於多重抗藥性結核病人治療藥物的描述，下列何者為非？
 - 通常藥物的治療效果較第一線抗結核藥物好
 - 通常藥物的價錢較第一線抗結核藥物貴
 - 通常藥物的副作用較第一線抗結核藥物多
 - 通常藥物的取得較第一線抗結核藥物困難
- 【 A 】關於多重抗藥性結核病人的進階都治，下列何者為非？
 - 通常每天都治 1 次
 - 部分病人會採視訊都治
 - 住院中仍要執行都治
 - 常因地制宜採取不同的都治措施
- 【 C 】以下哪一種共病症不是肺結核的危險因子？
 - 糖尿病。
 - 長期使用類固醇。
 - 肝硬化。
 - 頭頸癌。
 - 腎衰竭。
- 【 C 】甚麼樣的肺結核病人，完治後容易再復發？
 - 初期胸部 X 光片有開洞

- (B) 兩個月治療後，痰液培養仍呈陽性
(C) 以上皆是
8. 【 B 】 下列哪一種藥物用在洗腎病患時須調整治療頻率？
(A) Moxifloxacin
(B) Pyrazinamide
(C) Isoniazid
(D) Rifampicin
9. 【 E 】 下列哪一種藥物不適合孕婦使用？
(A) Moxifloxacin
(B) Pyrazinamide
(C) Isoniazid
(D) Rifampicin
(E) Rifabutin
10. 【 A 】 下列哪一種症狀發生時，不需立即停藥？
(A) 輕微皮膚搔癢
(B) 視力模糊
(C) 嚴重之皮疹
(D) 眼白變黃
(E) 聽力受損
11. 【 C 】 決定關係好壞的因素是？
(A) 溝通
(B) 印象
(C) 感覺
(D) 寵愛
12. 【 B 】 什麼會讓一個人的心打開？
(A) 在乎對方
(B) 同理對方
(C) 教育對方
(D) 順應對方
13. 【 B 】 哪一個是對同理心最好的描述？
(A) 了解到對方想法
(B) 體會到對方的感覺
(C) 清楚到對方意圖
(D) 看到對方的處境
14. 【 D 】 為何同理心可以幫助溝通？
(A) 了解到對方想法
(B) 對方會放下心防
(C) 對方的心會被打開
(D) 以上皆是

15. 【 D 】 如何用同理心回應病人這個反映：「我怎麼會這麼倒楣得這個病？」
- (A) 「對啊，你好可憐喔！」
 - (B) 「你真的要乖乖吃藥才行！」
 - (C) 「不要擔心，這病可以治喔！」
 - (D) 發現自己有這病一定很不舒服吧！」
16. 【 B 】 關於潛伏結核感染(LTBI)診斷的敘述，何者為非？
- (A) 宿主的免疫反應
 - (B) 出現體重減輕
 - (C) 痰培養陰性
 - (D) 胸部 X 光檢查正常
17. 【 C 】 潛伏性結核病與活動性結核病的區別，下列那一個敘述不正確？
- (A) 潛伏性結核病患體內的結核病菌被包裹住(處於休眠狀態)
 - (B) 潛伏性結核病患較不會把病菌傳染給別人
 - (C) 潛伏性結核病患之結核菌素檢查結果通常呈陰性
 - (D) 潛伏性結核病患通常情況下，胸部 X 光檢查結果正常
18. 【 D 】 需要進行 LTBI 篩檢的高風險族群，下列何者除外？
- (A) 愛滋病人
 - (B) 所有接觸者
 - (C) 接受生物製劑治療的病人
 - (D) 糖尿病患者
19. 【 C 】 常用的 LTBI 處方，下列何者除外？
- (A) 三個月 3HP
 - (B) 九個月 9H
 - (C) 兩個月 2RZ
 - (D) 四個月 4R
20. 【 D 】 有關潛伏性結核病的相關敘述，何者正確？
- (A) 3HP 不適用於 2 歲以下的幼兒
 - (B) 進行丙型干擾素檢查(IGRA)可用於所有年齡的接觸者
 - (C) IGRA 檢驗陰性即可排除潛伏結核診斷
 - (D) 短程處方 3HP 相較 9H 較少產生肝毒性