

戒癮精神科門診					
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
基隆醫院	上午 武	下午 張	16-18 *武	晚上 張	MON TUE WED THU FRI
長庚醫院	上午 陳	下午 *陳	晚上 陳		
維德醫院	上午 張	下午 劉	晚上 張		

★ 替代治療門診



衛生福利部基隆醫院

地址 基隆市信義區信二路268號

替代治療預約電話 (02)2429-2525#3387或3609



長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院

地址 基隆市安樂區蔡金路222號 (本院)

地址 基隆市安樂區基金一路208巷200號 (情人湖院區)

替代治療預約電話 (02)2432-9292#2166



維德醫療社團法人基隆維德醫院

地址 基隆市中正區調和街210號

電話 (02)2469-6688#1202

美 美沙冬 吉 丁基原明因吉下錠

K他命的三段式治療



Step 1  
戒毒藥物

在戒除K他命的工作上，治療包括要藥物與心理治療，或家族治療。



Step 2  
肉毒桿菌


K他命膀胱炎的膀胱有很多皺紋，膀胱變小，施打肉毒桿菌去除膀胱皺紋增大膀胱容量，肉毒桿菌素也能阻斷疼痛的感覺。




Step 3  
膀胱擴張成型術

(Augmentation Cystoplasty)

有無法忍受或難處理的症狀時，需考慮膀胱擴張成型術，手術將膀胱部分切除，接一段小腸或是大腸進去做膀胱。



人生要贏 不藥贏



基隆市七堵區明德一路169號

免費諮詢專線

0800-770-885

FACEBOOK 粉絲專頁



111年11月 印製6,000張



基隆市衛生局 關 您

廣告

# 拉K對膀胱傷害風險分析

資料來源：依據基隆市105~106年使用三、四級毒品個案之研究報告

你相信  
這會發生  
在您身上嗎？



症狀爆發的時間  
快者2個月，慢者15年  
K愈多，愈長K者  
越早爆膀胱



正常膀胱黏膜

黏膜裂縫

## 泌尿系統

膀胱容量只剩1/10



黏膜下出血

出血更明顯

疼痛不堪!!!



尿出鼻涕狀的東西，是受損的膀胱黏膜

風險高12.73倍



風險高12.78倍

別看!很快你也會這樣

施用  
6個月以下



施用  
25個月



風險高3.9倍



風險高5倍



戒癮6個月以上



持續  
施用

過去的12個月內、您有沒有出現以下情況？

是	否
1. 你有使用醫療原因以外的其他藥物？	1分 0分
2. 你有濫用經醫生處方的藥物？	1分 0分
3. 你在同一時間內曾濫用超過一種藥物？	1分 0分
4. 當你想要停止濫藥的時候，你總是能夠停止？	0分 1分
5. 你能一星期不濫用藥物？	0分 1分
6. 即使你停止濫藥一段時間，仍然會出現眼前昏黑或產生幻覺？	1分 0分
7. 你曾因濫藥而感到不安或懷有罪疚感？	1分 0分
8. 你的父母或伴侶曾責備你濫用藥物？	1分 0分
9. 你曾因濫藥而導致你與父母或伴侶出現問題？	1分 0分
10. 你曾因濫藥而失去朋友？	1分 0分
11. 你曾因濫藥而忽略家人？	1分 0分
12. 你曾因濫藥而導致在工作或學校內遇到麻煩？	1分 0分
13. 你曾因濫藥而影響學業或工作？	1分 0分
14. 你曾因濫藥而有打鬥行為？	1分 0分
15. 你曾為了取得藥物而從事非法活動？	1分 0分
16. 你曾因藏毒而被捕？	1分 0分
17. 你曾因停止濫藥而感到不適(出現戒斷症狀)？	1分 0分
18. 你曾因濫藥而出現健康問題(例如：失憶、胃痛、尿頻、鼻炎等)？	1分 0分
19. 你曾因濫藥而向他人求助？	1分 0分
20. 你曾因濫藥而接受戒毒治療？	1分 0分

我的分數  
是  
分

0分  
沒有危險

1-5分  
低度危險

6-10分  
中度危險

11-15分  
深度危險

15-20分  
非常嚴重

1-5分 建議就醫

6分以上務必門診治療

by Harvey A. Skinner, PhD and the Centre for Addiction and Mental Health, the Youth Drug Problem Concern Working Group.